

ПАМЯТКА

для населения

ПАСТЕРЕЛЛЁЗ СВИНЕЙ

Пастереллёз свиней - заболевание бактериального характера, поражающее в основном молодых особей. Его вызывает бактерия *Pasteurella multocida*. Пастерелла отличается коротким инкубационным периодом - от 3-4 часов до 2 недель. Болезнь наносит существенный удар по здоровью животных: пастереллез в 40% случаев заканчивается летальным исходом.

Источником инфекции являются больные и переболевшие свиньи (пастереллоносители), выделяющие возбудителя с истечениями из носа, выдыхаемым воздухом, слюной, фекалиями.

Факторы передачи возбудителя: заражение здоровых свиней происходит алиментарным и аэрогенным путем, через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Возбудитель пастереллеза передается здоровым свиньям через инфицированные корма, воду, почву, предметы ухода за животными, молоко, кровососущих насекомых, мух. Переносчиками болезни могут быть клещи и мыши.

Клинические признаки - существуют 3 формы заболевания:

Сверхострая. Свиньи отказываются от пищи, выглядят подавленными. Наблюдаются отек шеи, одышка, проблемы в работе сердца. Кожа синее на животе, бедрах, ушах. Температура повышается до 41 оС. Летальный исход возможен уже спустя 1-2 суток.

Острая. Кожа покрывается красными пятнами, повышается температура, развивается насморк с обильными выделениями из носа. Свиньи кашляют. Опухшие слизистые становятся синеватыми, увеличение их объемов иногда приводит к удушью. При отсутствии своевременного лечения через 5-9 суток происходит гибель поросят.

Хроническая. На каждом покрове заметна экзема, суставы опухают. Болезнь сопровождается постепенной потерей веса. Гибель возможна через 1-2 месяца.

Лечение. Для лечения пастереллёза применяется гипериммунная сыворотка против пастереллёза в комплексе с [антибиотиками](#) и сульфаниламидами. Через 14 дней после введения гипериммунной сыворотки всех достигших прививочного возраста животных вакцинируют против пастереллеза, руководствуясь наставлением по применению соответствующей вакцины.

Меры профилактики:

- всех поступающих в хозяйство животных выдерживать в карантине 30 дней;
- комплектовать стада животными только из хозяйств, благополучных по пастереллёзу;
- на фермах иметь санпропускники и обеспечить обслуживающий персонал сменной одеждой и обувью;
- в неблагополучных по пастереллёзу зонах проводить обязательную вакцинацию животных;
- хозяйства, в которых был зарегистрирован пастереллёз, в течение года комплектовать только вакцинированным поголовьем;
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию свиноголовья.
- дератизационные мероприятия по уничтожению грызунов.

ПОМНИТЕ!!!!

Своевременная вакцинация, создание оптимальных условий для содержания свиноголовья, подразумевающих под собой поддержание температурного режима в помещении, где **содержатся животные, использование качественных кормов позволит сохранить жизнь и здоровье Ваших животных.**