

ОБСЛУЖИЛИ
СОТРУДНИКИ СКОРОЙ ПОМОЦИИ.
Ю ЧЕТЫРЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯ.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕНЬ

Клещи всё еще активны!

Крымская геморрагическая лихорадка - опасная для жизни людей инфекционная болезнь, сезонные проявления которой - апрель-сентябрь. Переносчиком и хранителем вируса являются клещи, которые сохраняют его пожизненно и передают потомству.

Клещи обитают, в основном, в целинных (невспахиваемых) участках (балки, овраги, лесопосадки и др.), где могут нападать на животных и человека. Их естественные прокормители - дикие и домашние животные: коровы, козы, овцы, лошади, зайцы, ежи...

Заражение через укус клеща может произойти при пребывании людей в поле, на пастбище, сенохосе, при уходе за животными.

Несмотря на то, что домашние животные не болеют после укуса клеща, в их крови в определенный период может находиться вирус КГЛ, поэтому контакт с кровью, например, при принятии родов у коров или забое домашнего животного, создает риск заражения КГЛ.

Наличие устойчивых природных очагов КГЛ на территории Сальского района требует своевременного проведения противоклещевых обработок пастбищ, мест водопоя, скотных поместий и по-головья домашнего скота. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО: регулярно проводить купку животных или опрыскивание рас-

тварами акарицидов (энтомозац, цинерид, неостомозан); проводить смену выпасов, путем деления территории на участки; проводить ежедневный двукратный осмотр домашних животных и сбор клещей; регулярно проводить вакцинации, дегельминтизации и противоклещевые обработки собак, используемых для охраны подворий, и содержать их на привязи; регулярно проводить обработки скота, поступающего в личные хозяйства (акарицидами дважды, сразу по прибытии и через 10-12 дней); соблюдать ветеринарно-санитарные требования к поместиям, территории, утилизации навоза; ежедневно очищать стойла, выгулы, кормушки, пометания и пристегающую крепкую от на ваза и остатков корма;

весной и осенью необходимо ликвидировать на территории базов всю кустарниковую и травянистую растительность; постоянно истреблять грызунов и хорошо тампонировать входы в норы на всей территории базов, включая пометания, и вокруг за-

боров; весной, до начала выпаса, обочины дорог, по которым перегоняют скот, присельские выгоны и территории, находящиеся вне севооборота, подвергать боронованию и дискованию, поскольку на культурных пастбищах запас клещей в 10-30 раз меньше, чем на естественных.

ЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:

- при работе с животными необходимо, чтобы одежда плотно прилегала к телу, не позволяя зацеплять клещам под неё (длинные рукава, длинные брюки), волосы должны быть заправлены под косынку, брюки заправлены в носки;

- надо осматривать собак и других домашних животных для обнаружения и удаления с них приставшихся и присосавшихся клещей;

- удалять клещей с животных необходимо пинцетом, на руки нужно надевать резиновые перчатки, а собранных клещей поместить в банку с акарицидным раствором.

Если вас укусил клещ, то необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение!

И.Д. СЫТНИК,
ведущий ветеринарный
врач Сальского филиала
ГБУ РО «Ростовская
облСББЖ с ПО».